

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU – SAÚDE

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA

Cargo: S02 - EMERGENCISTA ADULTO

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:V	B	O enunciado se refere ao objetivo principal do texto e logo no parágrafo de introdução lê-se “Se a família Fritzke não morasse em Santa Catarina, Margarida provavelmente teria perdido seu outro filho por falta de doadores. Nos demais...vida. ”Todos os outros parágrafos se dedicam a confirmar a excelência do trabalho desenvolvido pelos médicos de Santa Catarina.	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	A	Na oração destacada, se empregarmos o verbo estar no pretérito imperfeito do subjuntivo (estivessem), para manter a coerência verbal, o verbo DEIXAR precisará ser empregado no futuro do pretérito (deixariam). A frase, então, ficaria assim: Se eles estivessem engajados,.. dificilmente deixariam...”	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	B	A única alternativa que apresenta os significados dos elementos grifados nas palavras, respectivamente, é companhia (COordenadores) e alma (PSICÓlogos). fNova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha, p.p.99 e 125	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	A	HAVIA COMETIDO é a forma composta do pretérito mais-que-perfeito do verbo cometer. A forma simples correspondente é cometera. Cf. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha, p. 470	INDEFERIDO	-

Cargo: S03 - EMERGENCISTA ADULTO - URGÊNCIA MENTAL

Disciplina: HIST . GEOG. E CONHEC. GERAIS DE ARACAJU E SERGIPE

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:V	A	No Estado de Sergipe, o período úmido se inicia exatamente em abril, fazendo com que a região possua um inverno úmido. Com isso, a alternativa B torna-se inviável, pois afirma que o mês de abril é o fim do período chuvoso.	INDEFERIDO	-

Cargo: S02 - EMERGENCISTA ADULTO

Disciplina: CONHEC. BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
18 - Gab.:V	C	“Morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela.”. Assim, no cálculo das taxas ou coeficientes de mortalidade materna devem ser considerados os óbitos maternos diretos e indiretos e não apenas os diretos como está apresentado na alternativa A. Portanto, a taxa ou coeficiente de mortalidade materna é a relação percentual entre os óbitos maternos diretos e indiretos em um determinado período e o nº de nascidos vivos no mesmo período. Dessa forma, a alternativa A está incorreta. Mantido o gabarito C, única resposta correta.	INDEFERIDO	-

Cargo: S05 - EMERGENCISTA INFANTIL

Disciplina: CONHEC. BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
19 - Gab.:V	A	De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 104, de 25 de janeiro de 2011 que define, entre outras coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória, as pneumonias fazem parte da Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinela - LNCS, sendo assim a única alternativa correta diante do que foi solicitado na questão.	INDEFERIDO	-

Cargo: S12 - OFTALMOLOGISTA

Disciplina: FUNDAM BASICOS DE MEDICINA

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
22 - Gab.:V	C	Na possibilidade de morte violenta ou acidental, a conduta correta é encaminhar o cadáver para perícia médico-legal no IML.	INDEFERIDO	-

Cargo: S02 - EMERGENCISTA ADULTO

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
47 - Gab.:V	C	O gabarito liberado para essa questão foi a própria letra C. A principal hipótese diagnóstica é colecistite aguda. Recurso equivocado por possível erro na conferência do gabarito.	INDEFERIDO	-

Cargo: S03 - EMERGENCISTA ADULTO - URGENCIA MENTAL

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
38 - Gab.:V	D	O sintoma de íleo paralítico não corresponde à intoxicação por barbitúrico, mas sim por opióides. A referência é o livro Emergências Psiquiátricas, 2ª Edição, João Quevedo e Flávio Kapczinski e colaboradores, Artes Médicas nas folhas 207 e 208.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	D	Mantido o Gabarito tendo em vista o esclarecimento anterior, já que as questões 38 e 39 são interligadas.	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	C	Dos sintomas, observa-se além dos referidos à ansiedade e hipertensão arterial sem histórico prévio. Dentre as opções oferecidas para investigação, a única plausível, perante os sintomas, seria feocromocitoma. A referência é o livro Emergências Psiquiátricas, 2ª Edição, João Quevedo e Flávio Kapczinski e colaboradores, Artes Médicas na folha 150.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	E	O candidato não apresentou argumentação teórica que fundamente a sua discordância em desacordo com o item 11.3 do edital na página 10.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	B	Em relação ao tratamento, o candidato tem razão no recurso em função de outras drogas que também podem ser utilizadas, embora a literatura seja controversa.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: S05 - EMERGENCISTA INFANTIL

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
26 - Gab.:V	B	Os critérios de internação em casos de queimaduras são: queimaduras de segundo grau em mais de 10% da superfície corpórea ou de terceiro grau em mais de 3%; queimaduras elétricas; queimaduras de áreas especiais como face, mãos, pés e genitálias; diabéticos, cardiopatas e hemoglobiopatias.	INDEFERIDO	-

		Acidentes. Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 3. Cap.2.7 página 93.		
27 - Gab.:V	A	A adequada coleta de urina é essencial para se evitar resultados falso-positivos e deve ser feita após limpeza da genitália com água e sabão. Nos pacientes com controle urinário, o método ideal para coleta da urina é o jato médio em ambos os sexos; naqueles sem controle miccional, a urina pode ser coletada através de saco coletor, punção suprapúbica ou cateterismo vesical. A punção suprapúbica é um método invasivo apesar de ser de fácil execução e relativamente seguro. Está indicado nos casos em que a coleta natural suscita dúvidas como nos casos de diarreia aguda, dermatite perineal, vulvovaginites e balanopostites. Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 17. Cap.1 página 1318.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	B	A radiografia toracoabdominal é um exame radiológico simples que permite a visualização do coto esofágico proximal contrastado pelo ar ("uma bolha de ar supraesternal") assim como a presença de ar no intestino delgado, demonstrando a existência de fistula no esôfago distal na traqueia. Urgências cirúrgicas no lactente e na criança maior. Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 29. Cap.1.4. página 2597.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	D	A alteração do gabarito para gluconato de cálcio – opção B, é a resposta correta segundo o capítulo de insuficiência renal aguda do Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 27. Cap.8. página .2369.	DEFERIDO	B

Cargo: S06 - EMERGENCISTA ORTOPEDIA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
29 - Gab.:V	B	A fratura do tipo I, de acordo com a bibliografia Traumatologia Ortopédica, SBOT, cap. 5, p. 42, é a de melhor prognóstico.	INDEFERIDO	
30 - Gab.:V	B	De acordo com a bibliografia Traumatologia Ortopédica, SBOT, cap.6, p. 48, as lesões associadas ocorrem em 50%	INDEFERIDO	

		dos casos.		
31 - Gab.:V	D	A opção errada, conforme solicitado na questão é a da letra A, pois a fratura da cavidade glenóideia do tipo IV, da classificação de Ideberg, não é cominutiva e, portanto não causa comumente a artrose, o que torna o recurso pertinente.	DEFERIDO	A
37 - Gab.:V	B	O tratamento proposto é a fixação com fio de Steinman. De acordo com a bibliografia Traumatologia Ortopédica, SBOT, cap.16 p.172, 173, o fio de Steinman deve ser o de 1.0mm.	INDEFERIDO	
39 - Gab.:V	B	A questão refere-se a fratura de Bennet. A fratura em Y é chamada de fratura de Rolando, portanto é uma alternativa errada. Além do mais, não houve respaldo do recurso em bibliografia que o justifique, conforme exigência do edital.	INDEFERIDO	
43 - Gab.:V	E	A fratura tipo A3 da classificação AO para fraturas do terço distal do fêmur compreende uma fratura complexa, ou seja, cominutiva e portanto o traço não pode ser considerado simples. Além do mais, não houve respaldo do recurso em bibliografia que o justifique, conforme exigência do edital.	INDEFERIDO	

Cargo: S07 - ENDOCRINOLOGISTA

Disciplina: CONHEC ESPECIFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
27 - Gab.:V	B	Os linfomas da tireoide são malignidades raras da glândula. O MALT, em verdade, não é o mais frequente como está descrito no livro utilizado como referência para a questão. Este linfoma pode se transformar num linfoma de células B, ou de células grandes. Por isso acho justa a anulação da questão, visto que existe um erro no livro texto Willians.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: S12 - OFTALMOLOGISTA

Disciplina: CONHEC. ESPECÍFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
---------	-------------------	---------------	-----------	-----------------------

35 - Gab.:V	D	O candidato não prestou atenção à palavra EXCETO do enunciado original: Questão 35 Com relação à conjuntivite primaveril, é correto afirmar, EXCETO que: A) é bilateral na maioria dos casos; B) é recorrente; C) a doença palpebral caracteriza-se por hipertrofia papilar difusa no tarso superior; D) afeta preferencialmente meninas na segunda década de vida; E) os estabilizadores de mastócitos não são eficazes como monoterapia. <i>Oftalmologia Clínica: Uma Abordagem Sistemática</i> ; Kansky J, pag 229, Butterworth-Heinemann, Sexta edição, 2008.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	B	Cerca de 30% dos raspados corneanos apresentam cultura negativa. <i>Oftalmologia Clínica: Uma Abordagem Sistemática</i> ; Kansky J, pag 270, Butterworth-Heinemann, Sexta edição, 2008.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	E	A opção não se refere à retinopatia serosa central acompanhada de membrana neovascular. <i>Oftalmologia Clínica: Uma Abordagem Sistemática</i> ; Kansky J, pag 650, Butterworth-Heinemann, Sexta edição, 2008.	INDEFERIDO	-
41 - Gab.:V	B	Há caracteristicamente um defeito pupilar aferente no olho afetado. <i>Oftalmologia Clínica: Uma Abordagem Sistemática</i> ; Kansky J, pag 790, Butterworth-Heinemann, Sexta edição, 2008.	INDEFERIDO	-

Cargo: S15 - PEDIATRA

Disciplina: CONHEC ESPECIFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	B	Dentre os principais agentes virais causadores de artrite estão os vírus da rubéola, da dengue e o parvovirus, sendo que o da rubéola é a causa mais frequente, grave e prolongada de artrite viral. Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 25. Cap.11. página	INDEFERIDO.	-

		2221.		
50 - Gab.:V	B	A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a amamentação exclusiva por aproximadamente 6 meses e complementada até os 2 anos ou mais. Como o enunciado da questão não cita o período de exclusividade da amamentação, altera-se o gabarito para o período total da amamentação. Tratado de Pediatria Sociedade Brasileira de Pediatria. Lopez FA & Campos Junior D. 2010. Sessão 8. Cap.1. página 327.	DEFERIDO	E

Cargo: S18 - PSQUIATRA OU MÉDICO COM FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Disciplina: CONHEC. ESPECÍFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
36 - Gab.:V	C	Não foi mencionada qualquer alteração real da memória nem do raciocínio, portanto, não existe evidência de transtorno cognitivo leve. Trata-se de um problema de concentração (atenção) que está vinculado ao estado afetivo, à desmotivação e ao sentimento de abandono. A paciente não tem mais contato com o marido, nem com os filhos nem com o trabalho. O fato de descrever detalhadamente cada um de seus problemas, assim como os remédios e os seus respectivos horários indica: 1) ausência evidente de problemas mnêmicos; 2) preocupação excessiva consigo mesma, estreitamento dos horizontes sociais. A queixa de problemas de memória é uma das mais comuns nos estados depressivos ansiosos, de natureza reativa, secundária, em que surge a dificuldade de concentração, fadiga mental, neurastenia. Geralmente estão presentes o isolamento e a perda de papéis familiares e sociais (aposentadoria, ausência do cônjuge e dos filhos), sendo muito constantemente relacionados à "empty nest syndrome".	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	A	Não foi mencionada qualquer alteração real da memória nem do raciocínio, portanto, não existe evidência de transtorno cognitivo leve. Trata-se de um problema de concentração (atenção) que está vinculado ao estado afetivo, à desmotivação e ao sentimento de abandono. A paciente não tem mais contato com o marido, nem com os filhos nem com o trabalho. O fato de descrever detalhadamente cada um de		-

		seus problemas, assim como os remédios e os seus respectivos horários indica: 1) ausência evidente de problemas mnêmicos; 2) preocupação excessiva consigo mesma, estreitamento dos horizontes sociais. A queixa de problemas de memória é uma das mais comuns nos estados depressivos ansiosos, de natureza reativa, secundária, em que surge a dificuldade de concentração, fadiga mental, neurastenia. Geralmente estão presentes o isolamento e a perda de papéis familiares e sociais (aposentadoria, ausência do cônjuge e dos filhos), sendo muito constantemente relacionados à “ <i>empty nest syndrome</i> ”.	INDEFERIDO	
38 - Gab.:V	A	Não foi mencionada qualquer alteração real da memória nem do raciocínio, portanto, não existe evidência de transtorno cognitivo leve. Trata-se de um problema de concentração (atenção) que está vinculado ao estado afetivo, à desmotivação e ao sentimento de abandono. A paciente não tem mais contato com o marido, nem com os filhos nem com o trabalho. O fato de descrever detalhadamente cada um de seus problemas, assim como os remédios e os seus respectivos horários indica: 1) ausência evidente de problemas mnêmicos; 2) preocupação excessiva consigo mesma, estreitamento dos horizontes sociais A queixa de problemas de memória é uma das mais comuns nos estados depressivos ansiosos, de natureza reativa, secundária, em que surge a dificuldade de concentração, fadiga mental, neurastenia. Geralmente estão presentes o isolamento e a perda de papéis familiares e sociais (aposentadoria, ausência do cônjuge e dos filhos), sendo muito constantemente relacionados à “ <i>empty nest syndrome</i> ”.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	D	Ocorreu erro de digitação do examinador, na qual deveria ter afirmado “vômitos induzidos e uso de laxantes, diuréticos e exercícios” e não “pelo” conforme consta na questão. A questão deve ser anulada por ter duas afirmativas incorretas. Sendo assim, o recurso é deferido.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: S20 - UROLOGISTA

Disciplina: CONHEC. ESPECÍFICOS

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
26 - Gab.:V	D	Como sabemos, a úlcera genital do linfogranuloma venéreo tem duração de mais ou menos 5 dias. Somente após algumas semanas, já com a resolução da úlcera, é que surge a adenopatia inguinal, o que torna a alternativa D a única incorreta, pois esta contempla que a úlcera é CONCOMITANTE à adenopatia, o que não é verdade. Podemos comprovar, com o trecho do livro Campbell's Urology, 9ª edição, página 377, que diz que a adenopatia inguinal e os sintomas constitucionais surgem 2 a 6 semanas após a resolução da úlcera: "The initial manifestation of infection is usually a single, painless ulcer... Patients usually presents with painfull unilateral suppurative inguinal adenopathy and constitutional symptoms that occur 2 TO 6 WEEKS AFTER RESOLUTION OF THE ULCER."	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	E	Segundo Campbell's Urology, 9ª edição, página 2951, todas as alternativas da questão referem-se a um critério para seleção de pacientes com câncer de baixo risco segundo Epstein, exceto a representada pela letra E, como podemos comprovar no texto, em negrito: "Epstein and colleagues (1998) evaluated 163 radical prostatectomy specimens of clinical stage T1c... they determined that the best model to predict insignificant tumor is a free/total serum PSA ratio of 0,15 or greater [letra A] AND favorable needle biopsy findings (fewer than three cores involved [letra B], none of the cores with more than 50% tumor involvement [letra C] and Gleason sum below 6 [letra D]). This model had a 94% positive predictive value for insignificant cancer." Como podemos observar, o ÚNICO critério não descrito no texto é o representando pela letra E (invasão perineural), o que torna a alternativa E incorreta, por não representar um dos critérios solicitados Portanto, o gabarito original está mantido.	INDEFERIDO	-