

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – CARGOS DE MÉDICOS

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

Cargo: M02 - MÉDICO CLÍNICO GERAL / 20H
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES)

| Questão | Resposta Original | Justificativa | Conclusão | Gabarito mudado para: |
|---|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 33 - Gab.:Z | B | O argumento do requerente não invalida a afirmação do gabarito. | INDEFERIDO | |
| 37 - Gab.:X | E | Na questão não é discutido o teor de álcool para causar toxicidade, mas sim, o benefício ou malefício da exposição ao uso de álcool. | INDEFERIDO | |
| 39 – Gab X 39 – Gab Y 39 – Gab Z | C D E | O argumento do requerente está correto. | DEFERIDO | ANULADA |
| 40 - Gab.:Y | C | As opções não contrapõem as duas localizações. | INDEFERIDO | |
| 43 - Gab.:Y | A | Trata-se de pacientes de risco, hipertensos e diabéticos que desenvolvem fibrilação atrial. | INDEFERIDO | |
| 44 - Gab.:Y | C | A gravidade depende da presença de infecção respiratória. | INDEFERIDO | |
| 53 - Gab.:Z | D | A reprodução textual do autor Harrison cita: "...porque não há limite abaixo do qual a HbA1c possa ser reduzida e as complicações do DM prevenidas". | INDEFERIDO | |
| 53 - Gab.:X | B | A citação do requerente não invalida o afirmado no gabarito. | INDEFERIDO | |

Cargo: M02 - MÉDICO CLÍNICO GERAL / 20H
Disciplina: CONHEC. BÁS. SAÚDE PUB. (CBS)

| Questão | Resposta Original | Justificativa | Conclusão | Gabarito mudado para: |
|-------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 26 - Gab.:Y | E | Apesar dos recursos para o financiamento da saúde bucal constituírem outro componente do Piso da Atenção Básica Variável separado do de saúde da família, os profissionais da saúde bucal são incorporados às equipes de saúde da família (Pactos pela Saúde, vol.4, p.24). | INDEFERIDO | |
| 30 - Gab.:Z | E | "A mortalidade no período neonatal (de 0 a 27 dias de vida) é particularmente influenciada pelas condições da | INDEFERIDO | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | gestação e do parto. A cobertura e a qualidade da assistência pré-natal e perinatal são fatores de grande importância na determinação da mortalidade infantil neonatal." (MEDRONHO, 2006) A mortalidade perinatal (de 22 semanas de gestação até 7 dias de vida) engloba os óbitos fetais que podem ser por causas não-evitáveis pela adequada atenção ao binômio mãe-filho. | | |
|--|--|--|--|--|